


*Ueber die Störungen
der Gegenrollung der Augen bei
Erkrankungen des Ohres.*



Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

in der

gesamten Medizin

verfaßt und einer

Hohen medizinischen Fakultät

der

Kgl. Bayer. Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt von

H. Abramowitsch

aus Simferopol (Rußland)

München 1914

Buchdruckerei Max Leutner, Augustenstraße 58.

Bei zahlreichen Untersuchungen an Wirbellosen, Fischen, Vögeln, Meerschweinchen, Hunden zeigte sich, daß durch Reizung des Ohrapparates Augenbewegungen ausgelöst werden können. Auch bei Menschen entstehen bei Kopfbewegungen kompensatorische Augenbewegungen: Gegenrollung (Raddrehung) Drehnystagmus*). Desgleichen entstehen der kalorische, galvanische und Kompressionsnystagmus. Die Labyrinthzerstörung auf der einen Seite wies einen wesentlichen Unterschied in diesen kompensatorischen Augenbewegungen zwischen der gesunden und kranken Seite auf, besonders in den ersten Tagen nach der Operation. Am deutlichsten kann dieser Unterschied nach einseitigem Durchschneiden des N. acustici (N. octavus nach Ewald) wahrgenommen werden.

Wie beteiligen sich die einzelnen Teile des Ohrlabyrinths bei diesen Augenbewegungen? Die Stellung der drei Kanäle und die Konstanz dieses Verhaltens ließen schon lange ahnen, daß diese mit dem Raum und seinen drei Dimensionen in naher Beziehung stehen. Als erster fand Flourens bei der Taube, daß nach der Durchschneidung der beiden horizontalen Bogengänge Augen und Augenlider starke andauernde Bewegungen machen, daß

*) I. Unter der Gegenrollung versteht man die Bewegungen der Augen, die entstehen bei Seitwärtsneigung des Kopfes. (s. S. 7)

II. Nystagmus nennt man im allgemeinen zitternde Bewegungen des Auges, welche sich sehr rasch und wieder in derselben Weise wiederholen,

nach dem Durchschneiden der beiden frontalen die Augen andauernde heftige konvulsivische (nystagmusartige) Bewegungen aufführen. Nach Bonhardt treten gleichzeitig mit Kopfbewegungen Augenbewegungen in derselben Richtung auf. Nach dem Durchschneiden der beiden sagitalen führen die Augen Drehungen aus, deren Stärke der Stärke der Kopfbewegungen proportional ist. Was besonders die Gegenrollung betrifft, so fand Beck bei Meer-schweinchen folgendes: Die Bogengänge spielen bei der Gegenrollung die Hauptrolle; die horizontalen Bogengänge üben auf die Augenstellung in der Primärlage einen Einfluß aus. Zur Gegenrollung bei der Seitenlage gehören drei intakte Bogengänge; jeder Bogengang muß dabei mit den die Gegenrollung ausführenden Muskeln auf beiden Seiten in Verbindung stehen. Die Gegenrollung bei Drehung des Kopfes um die Querachse wird von den beiden hinteren vertikalen Bogengängen ausgelöst. Jede Gegenrollung fehlte bei der beiderseitigen Labyrinthzerstörung.

Während die Endigungen der Augenmuskelnerven gut erforscht sind, besteht über die Endigung des N. acusticus große Unklarheit. Für uns kommen hauptsächlich die Fasern des Vestibularis, Ramus anterior N. acustici in Betracht. Ramus vestibularis entsteht aus den Ganglienzellen des Ganglion Scarpae. Von hier gehen die Fasern zum Nucleus acustici dorsalis (N. vestibularis). Hier liegen drei Kerne zusammen: Nucleus triangularis (dorsalis), Nucleus Deiters (großzellig) und N. Bechterew (angularis). Früher war man allgemein der Ansicht, daß der Deiter'sche Kern die Vermittlung zwischen Labyrinth und Auge übernehme. Nach den letzten Untersuchungen (Kohnstamm und Quensel) hat der Ramus anterior N. acustici nichts mit dem Deiter'schen Kerne zu tun. Der Bechterew'sche Kern ist die Ursprungstätte des Ves-

tibularis. Ueber die Function dieses Kernes war bis zur letzten Zeit sehr wenig bekannt. Untersuchungen der letzten Autoren zufolge steigen aus ihm die wichtigsten Bahnen und gelangen in hintere Längsbündel (Fasciculus vestibulo-mesencephalicus) zu den Augenmuskelkernen. Der Nucleus triangularis (dorsalis) ist noch mit der oberen Olive verbunden, von der ein Bündel zum Abducenskern geht.

Auf diesem Wege kommen die vom Ohrapparat ausgelösten kompensatorischen Augenbewegungen zustande. Uns interessiert hauptsächlich die Gegenrollung. Unter der Gegenrollung der Augen verstehen wir die Bewegung, die auftritt, wenn der Kopf der Schulter zu geneigt wird. Dabei führen die Augen zwei Bewegungen aus: eine rasch vorübergehende in der Richtung der Kopfneigung und eine zweite bleibende der Richtung der Neigung entgegengesetzte. Dieses Phänomen ist schon längst bekannt. Schon im Jahre 1786 fand Hunter als erster, daß die Augen bei Kopfbewegungen eine Drehung in entgegengesetzter Richtung ausführen. Dasselbe behauptete auch A. Hueck. Er konstatierte, daß die Augen bis zu 28° Neigung in ihrer Stellung in der Orbita bleiben und erst bei Steigerung der Neigung die Gegenrollung ausführten. Entschieden dagegen äußerten sich Johann Müller, Ritterich und Donders. Eine Stütze fand die Lehre von Gegenrollung, als Javal zeigte, daß Zylindergläser, die den Astigmatismus bei aufrechter Haltung des Kopfes gut korrigieren, bei Seitwärtsneigung des Kopfes dieses nicht mehr taten. A. Nagel stellte Untersuchungen an und sprach sich für die Gegenrollung aus. Woinow konnte mittels direkter Beobachtung den Winkel der Gegenrollung messen. Aber auch zu dieser Zeit wurde diese Meinung nicht von allen geteilt, und noch im Jahre 1894 wurde die Gegenrollung von Contejean und Delmas

ganz gelegnet und nur als eine Folge der Versuchsfehler angesehen. Im Jahre 1896 konnte W. Nagel durch zahlreiche eingehende Untersuchungen die Unrichtigkeit der Resultate der vorigen Autoren nachweisen und die Lehre bestätigen. Von den Arbeiten der letzten Jahre muß die von Sachs und Meller, Feilchenfeld hervorgehoben werden. Bezüglich des pathologischen Verhaltens der Gegenrollung ist vornehmlich auf R. Barany's Arbeit: Gegenrollung bei Normalhörenden, Ohrenkranken und Taubstummten hinzuweisen. Er untersuchte 150 Fälle und wollte dieses Phänomen klinisch verwerten. Der Grund der verschiedenen bis in die letzte Zeit währenden Meinungen lag gewiß in der Schwierigkeit, die Gegenrollung zu beobachten und zu messen. Die meisten Forscher bedienten sich „subjektiver“ Methode, d. h. Beobachter und Untersucher war ein und dieselbe Person. Diese Methode hatte große Nachteile und konnte weder ohne Fehler noch klinisch verwertbar sein. R. Barany wollte diese Fehler vermeiden und konstruierte hiefür einen Apparat, mit welchem man mittels eines Fadenkreuzes, das auf einen Iristreifen eingestellt wird, die Gegenrollung gut beobachten und genau messen kann. Er untersuchte 19 Normalhörende und 32 Ohrenkranke, die niemals an Schwindel litten. Es stellte sich heraus, daß zwischen den Normalhörenden und Ohrenkranken, die niemals an Schwindel litten, kein Unterschied in der Gegenrollung besteht.

Die Durchschnittszahlen, die er dabei gewonnen hat, benutzte er als Ausgangszahlen und verglich sie mit Zahlen von Ohrenkranken, die an Schwindel litten. Dabei fand er bei Normalen folgende Zahlen: Maximum der Gegenrollung 16° , Minimum 4° , Durchschnitt der Gegenrollung $7,7-8^{\circ}$. Bei den Ohrenkranken, die an Schwindel litten, fand Barany: Maximum der Gegenrollung 25° , Minimum -4° , Durchschnitt der Gegenrollung: $9,2-9,6$,

dazu große Differenzen an verschiedenen Tagen. Daraus schloß er: „klinisch bedeutungsvoll ist die Gegenrollung bei denjenigen Fällen, die an Schwindel leiden oder zu leiden vorgeben. Hier kann oft eine einmalige Untersuchung den Nachweis erbringen, daß eine organische Ursache für den Schwindel vorliegt, während ein mehrmals konstatiertes normales Verhalten der Gegenrollung mit Sicherheit entweder Simulation oder Neurose annehmen läßt. Deshalb ist die Gegenrollung besonders wertvoll in forensischen Fällen, in denen sie oft geradezu entscheidend für die Beurteilung des Falles werden kann.“ Wie wir aus diesem sehen können, soll das Phänomen der Gegenrollung nach Barany sehr wichtig sein.

Auf Anregung von Herrn Prof. Lohmann stellte ich an einer großen Zahl von Kranken Nachuntersuchungen an, die sich — wie Barany'sche Untersuchungen — auf die Gegenrollung bei Ohrenerkrankungen erstreckten. Ich habe die Untersuchung an dem Material der Kgl. Ohrenpoliklinik ausgeführt. Ich spreche dem hochgeehrten Vorstände, Herrn Prof. Heine, für die Erlaubnis, die Untersuchung auszuführen und für die Ueberlassung des reichlichen Materials meinen ergebensten Dank aus. Ich untersuchte mit dem Barany'schen Apparat in derselben Weise, wie es Barany empfiehlt. Der Gebrauch des Apparates ist, wie ich bemerke kann nicht leicht, und es kommen doch Unterschiede in einigen Graden vor. In den meisten Fällen habe ich die Gegenrollung bei 45° für rgn und lgn*) gemessen. 60° Neigung, wie es Barany empfiehlt, finde ich zu eingreifend für die meisten Kranken, um die es sich hauptsächlich handelt. Insgesamt habe ich 100 Fälle untersucht. Diese Fälle teile ich in zwei Gruppen ein: Erste Gruppe (Tabelle I) Normalhörende und Ohrenkranke, die frei von Schwindel sind; zweite

*) rgn = rechts geneigt, lgn = links geneigt.

Gruppe (Tabelle II) Ohrenkranke, die an Schwindel leiden oder litten. Von der ersten Gruppe habe ich 63 Fälle untersucht. Schon bei der Untersuchung dieser Gruppe zeigten sich Abweichungen von den Barany'schen Zahlen. So verhalten sich die Fälle 2, 10, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 41, 43, 44, 52, 53, 60, ganz so, wie die Kranken bei Barany, die an Schwindel leiden, obwohl sie ganz frei von Schwindel waren. Die Zahl dieser Ausnahmefälle ist zu groß, um die Wichtigkeit der klinischen Bedeutung des Phänomens anzuerkennen. Auch wenn wir annehmen, daß Fehler um $1-2^0$ vorgekommen sind, so zeigen die Fälle 2, 21, 38, 52 so große Rollungszahlen, daß sie bei Beurteilung nur dieser Rollungszahlen zu der zweiten Gruppe (Ohrenkranke mit Schwindel) gerechnet werden sollten. Es ist selbstverständlich, daß ich bei der Anzahl dieser Ausnahmefälle andere Zahlen für die Gegenrollung bei Normalen erhalten habe.

Ich fand folgende Zahlen: Maximum der Gegenrollung 25^0-23^0 , Minimum $0,-5$. Durchschnitt der Gegenrollung $10^0-7,5$ durchschnittliche Summe aus rgn. und lgn. 17^0 . durchschnittliche Differenz zwischen rgn. und lgn. 5^0 .

Von der zweiten Gruppe habe ich 37 Kranke untersucht. Dabei zeigen die Fälle 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 27, 34, 35 Gleichgewichtsstörungen bei normaler Rollung. Nach Barany sind „alle Fälle, welche Gleichgewichtsstörungen ohne Nystagmus bei normaler Gegenrollung zeigen, neurotisch; einige zeigen vollständig ausgeprägte Hysterie und Neurasthenie“. Dieses dürfte doch nicht so einfach sein; zeigen ja die Fälle 5, 9 Gleichgewichtsstörungen mit normaler Rollung und dabei deutlichen Nystagmus. Da es sich um poliklinische Kranke handelte, konnte ich sie nicht mehrere Male untersuchen. Statt dessen untersuchte ich Patienten zu einer Zeit, in

welcher sie frei von Schwindel waren. Dabei zeigten diese Kranken in anfallsfreier Zeit normale Rollung. Nur der Fall 31 macht davon eine Ausnahme; auch in anfallsfreier Zeit bekam ich bei diesem Kranken große Rollungszahlen. Für die Kranken mit Schwindel fand ich folgende Zahlen: Maximum der Gegenrollung 35° — 25° ; Minimum 0° ,— 5° , Durchschnitt der Gegenrollung 13° — 9° , durchschnittliche Summe aus rgn. und lgn. 22° , durchschnittliche Differenz zwischen rgn. und lgn. 5° .

Was die Bedeutung des Phänomens der Gegenrollung betrifft, so möchte ich kurz zusammenfassend folgendes sagen: obwohl die klinische Bedeutung des Phänomens nicht in Abrede gestellt werden kann, so glaube ich aus meiner Untersuchung schließen zu dürfen, daß eine so weitgehende Bedeutung, wie sie ihm von mancher Seite zugeschrieben wird, nicht zukommt. Besonders muß betont werden, daß dem Phänomen in forensischen Fällen keine zwingend beweisende Bedeutung zukommt.

Zum Schlusse möchte ich Herrn Prof. Dr. Heine für die Uebernahme des Referats, Herrn Prof. Dr. Lohmann für Ueberlassung des Themas und Herrn Privat-Dozent Dr. Herzog für die Unterstützung meinen ergebensten Dank aussprechen.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Tabelle I

	Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	lgn	Summe	Differenz	kgr	45° rechts.	45° links.	Ohrbefund
1	Lechmeyer 25 J. (M.)	Kein Schwindel	2. VI. 13	r 1 l 9	6 10 3 12	16 4	4	341 374	347 383	331 371	Beiderseits typische Einziehungs- scheinungen links deutliche hintere Falte
2	Dietrich Jakob 55 J. (M.)	"	17. X.	r 1 l 20	25 18 10 30	43 30	7 10	180 200	205 220	162 190	Otitis media acuta
3	Baumann Max 17 J. (M.)	"	17. VI.	r 1 l 4	5 0 1 5	5 5	5 3	164 224	169 228	164 223	R.: große zentrale Perforation, keine Secretion L.: schleimige Secretion, im vord. unter. Quadranten Perforation
4	Aigner Anna 16 J. (W.)	"	18. VI.	r 1 l 5	4 10 5 12	14 12	6 2	180 199	184 204	170 192	R.: trockene Perforation, Verkal- kungen L.: Narbe
5	Mühlhofer Berta 24 J. (W.)	"	18. VI.	r 1 l 5	4 4 5 3	8 8	0 2	343 49	347 54	339 46	Cerum. obt links
6	Scherer Falian 44 J. (M.)	"	19. VI.	r 1 l 2	7 7	9	5	350	352	343	L.: reichliche Secretion, große Per- foration
7	Poß Katharina 56 J. (W.)	"	21. VI.	r 1 l 11	3 13 10 21	13 21	7 1	23 30	33 41	20 20	Trommelfell bds. normal
8	Schiffahrt Lilly 17 J. (W.)	"	15. X. 18. X.	r 1 l 4	7 4 4 8	11 12	3 4	226 192	233 196	222 184	Kein besond. Befund, an d. Ohren Tonsillitis chronica
9	Sedlmayer Lorenz 43 J. (M.)	"	25. VI.	r 1 l 5	6 5 5 5	11 12	1 0	210 195	216 200	205 190	R.: über d. Warzenfortsatz erstrek- kende periostitische Schwellung. Druckempfindlichkeit

Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	Rechte	linke	Summe	Differenz	Kgr	Rechtsgen.	linksgen.	Ohrbefund
10 Ledner Johann 17 J. (M.)	Kein Schwindel	24. VI.	r 20 l 0	15 11	35 20	5 2	180 143	200 152	165 132		R.: Trommelfell atrophisch Verkalkung L. Kalkeinlagerung Perforation R: zentrale Perforation
11 Lezqus Hermann 24 J. (M.)	"	23. VI.	r 8 l 8	9 10	17 18	1 2	165 197	173 205	156 187		
12 Berger Friedrich 22 J. (M.)	"	27. VI.	r 10 l 10	9 8	19 18	1 2	202 213	212 223	193 205		
13 Hochholzner Christ. 25 J. (W.)	"	27. VI.	r 10 l 12	9 0	19 21	1 3	225 173	235 185	216 164		
14 Aicher Andreas 35 J. (M.)	" Nystagmus	30. VI.	r 14 l 12	12 0	26 21	2 3	45 347	59 359	33 338		R.: diffuse Rötung, hintere Falte vorgewölbt; Warzenfortsatzdruckempfindlich Otitis media acuta links. Mastoiditis. Am 3. IX. 13 Antrumoperation. Calorisch bds. erregbar
15 Spreiter Michael 47 J. (M.)	Kein Schwindel	22. X.	r 5 l 16	0 12	5 28	5 4	105 205	170 221	165 193		L.: nur ein klein. ober. Rand vom Trommelfell, Paukenschleimhaut gerötet, massige Secretion Beginnende Sclerose links
16 Ganz Franziska 19 J. (W.)	"	15. X.	r 10 l 7	0 2	10 9	10 5	200 245	210 252	200 243		R.: Totaldefekt d. Trommelfells L.: Trommelfell rest Perforation.
17 Geitner Johanna 19 J. (W.)	"	15. X.	r 0 l 3	2 2	8 5	4 1	210 188	216 191	208 186		R.: Eitrige Secretion, fast völlige membr. Athresie L. Tiefe Narbe
18 Bergmüller Kreszentia 9 J. (W.)	"	9. X.	r 6 l 6	9 9	15 15	3 3	210 210	216 216	201 201		
19 Wankmüller Gertrud 47 J. (W.)	"	3. X.	r 10 l 9	7 4	17 13	3 5	210 186	220 195	203 182		

Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	Rgn	Ign	Summe	Differenz	kgr	rechts. 45°	links. 45°	Ohrbefund
20 Seidel Vitus 64 J. (M.)	Kein Schwindel	6. X.	r	14	13	27	1	185	199	172	R.: Cerumen obt.
21 Schwab Adam	"	10. X.	r	17	4	21	13	174	191	170	R.: dickschleimige Secretion, Para- centesöffnung klappt weit L.: normal
22 Baur Josef 16 J. (M.)	"	11. X.	r	12	5	17	7	223	235	218	R.: trockene Perforation der M. Shz.
23 Gottschall Konrad 36 J. (M.)	"	11. X.	r	4	3	7	1	208	212	205	Normal
24 Proksch Otto 23 J. (M.)	"	14. X.	r	5	11	19	3	250	258	239	Otitis media acuta links; rechts Verkalkungen
25 Oekler Georg 46 J. (M.)	"	23. X.	r	1	7	6	13	226	233	220	Otitis media acuta bds.
26 Dr. Stephan 50 J. (M.)	"	29. X.	r	15	0	15	15	180	195	180	Otitis media acuta
27 Fischer Konrad 57 J. (M.)	"	30. X.	r	18	7	25	11	175	193	168	Kal. Prüfung bds. normale Erregbark.
28 Sommer Fritz 26 J. (M.)	"	31. X.	r	21	20	41	1	250	277	236	Otitis media acuta
29 Reiserzahn Josef 35 J. (M.)	"	5. XI.	r	14	10	24	4	340	354	330	R.: Narbe in Membrane Shrapnelli; L.: Einziehungen, narb. Veränderung
30 Scheller B. b. b. 21 J. (W.)	"	5. XI.	r	19	16	35	3	50	69	34	Otitis media acuta bds.
			r	10	12	22	2	170	180	158	
			r	17	10	27	7	195	212	185	
			r	7	4	11	3	100	107	186	
			r	8	10	18	2	215	223	205	
			r	17	5	22	12	230	247	225	Radikaloperation vor ein. Jahren; Weichteilenabsatz
			r	10	16	26	6	155	165	139	

	Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Anga	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	45o rechtsgn.	45o linksgn.	Ohrbefund
31	Burbauer Wolfgang 36 J. (M.)	Kein Schwindel	5. XI.	r 1	15 20	12 13	27 33	3 7	175 165	190 185	163 152	Trommelfell sehr dünn R. durchscheinendes Promontorium
32	Sexl Agnes 25 J. (W.)	"	5. XI.	r 1	17 18	7 -3	24 15	10 21	230 202	247 220	223 205	Sclerose bds. Kieferhöhlenentzündung
33	Wagner Peter 51 J. (M.)	"	6. XI.	r 1	20 15	5 5	25 20	15 10	200 165	220 180	195 160	Otitis media chronica
34	Oberwienner Johann 20 J. (M.)	"	7. XI.	r 1	12 11	10 8	22 19	2 3	40 183	52 194	30 175	R. chronische Eiterung, zentr. Perforation
35	Erlwein Georg 28 J. (M.)	"	8. XI.	r 1	7 5	0 3	7 8	7 2	206 158	213 163	206 155	Otitis media acuta rechts
36	Borstein James 36 J. (M.)	"	8. XI.	r 1	15 12	12 7	27 19	3 5	252 150	267 162	240 143	
37	Rohrl Babette 43 J. (W.)	"	10. XI.	r 1	15 10	0 4	15 14	15 6	200 156	215 166	200 152	
38	Zierl Antonie 51 J. (W.)	"	10. XI.	r 1	25 19	20 23	45 42	5 4	50 75	75 94	30 52	Otitis media acuta links, kal. Prüf.: Erregbark. bei 75 ccm 27o C.
39	Heigl Marie 16 J. (W.)	"	10. XI.	r 1	10 5	0 4	10 9	10 1	233 206	243 205	233 196	Rhinitis chron. bds.
40	Nickl Engelbert 43 J. (M.)	"	13. XI.	r 1	8 2	4 7	12 9	4 5	242 210	250 212	238 203	Sclerose links
41	Nael Kreszenz 33 J. (W.)	"	14. XI.	r 1	18 8	2 2	20 10	16 6	172 202	190 210	170 260	

Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	Roge	Iqn	Summe	Differenz	kgr	rechts. 45°	links. 45°	Ohrbefund
42. Rettinger Anna 24 J. (W.)	Klein Schwindel	14. XI.	r 13 l 12	10 14	23 26	3	210	223	200		
43. Stammelz Heinrich 70 J. (M.)	"	7. XI.	r 15 l 18	13 12	28 24	2	33	45	20		Otitis media chron. rechts, links Otitis media acuta kat. Pr.: Er- regbarkeit nach 150 ccm 27° C. Verkalkung. Secretion links
44. Fuchs Julius 50 J. (M.)	"	19. XI.	r 20 l 17	14 15	34 32	0	210	230	100		Trommelfell bds. normal
45. Kätterle Anna	"	19. XI.	r 10 l 6	4 5	14 11	6	177	187	173		Trommelfell bds. normal
46. Zieger Andreas 24 J. (M.)	"	20. XI.	r 8 l 9	12 3	12	4	174	182	170		Trommelfell bds. normal
47. Huber Michael 65 J. (W.)	"	1. X.	r 7 l 0	11 0	11	7	173	174	163		Otitis media, Schwerhörigk. Trom- melfell bds. normal
48. Wörner Wilhelm 39 J. (M.)	"	25. XI.	r 6 l 8	6 6	12 14	2	204	212	198		Entzündung in d. Membrana Shrap- nelli rechts i. e. Atropine im hint. Abschnitt
49. Kammerloher Kath. 21 J. (W.)	"	24. XI.	r 11 l 13	6 7	16 20	4	200	220	200		Otitis media rechts, Perforation d. Membr. Shrapnelli
50. Brüderl Heinrich	"	24. XI.	r 7 l 10	6 5	13 15	1	181	188	175		Normal
51. Stengel Paul	"	24. XI.	r 5 l 8	10 8	15 13	5	175	180	165		Otitis media rechts
52. Schrautetter Franz 18 J. (M.)	"	13. X.	r 9 l 22	3 8	12 30	6	183	192	180		Vor 2 Jahren Meningitis; seither Taubheit. Für Kal. Reize und Drehungen, bds. unerregbar

	Name, Alter Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Auge				Summe	Differenz	kgr	450		Ohrbefund
				lgr	lgr	lgr	lgr				rechts.	links.	
53	Fend Josef 34 J. (M.)	Kein Schwindel	13. X.	r 17 l 17	10 5	27 22	7 12	200 220	217 237	190 215			Mit 14 Jahren angeblich nach Gelenkrheumatismus Auftreten von Taubheit. Trommelfell bds. normal
54	Auer Karl	"	18. X.	r 5 l 7	2 10	7 17	3 3	195 190	200 197	193 180			Absolute Taubheit für alle Tonquellen und Pfeifen. Kal. bds. unregbar
55	Baumann Josef 24 J. (M.)	"	17. XI.	r 15 l 6	0 3	15 9	15 3	215 195	230 201	215 192			K.: Secretion; zentr. Perforation L.: normal
56	Hartl Mathias 55 J. (M.)	"	16. XI.	r 10 l 9	4 12	14 21	6 3	182 226	192 235	178 214			Trommelfell bds. normal, Schwerhörigkeit
57	Kaden Walter 19 J. (M.)	"	20. XI.	l 7	8	15	1	190	197	182			Nerv. Schwerhörigkeit
58	Schreiner Marie 45 J. (W.)	"	23. X.	r 12 l 16	5 13	17 29	7 3	205 193	217 209	200 180			Otitis media bds. Kal. Prüf.: L.: nach 150 ccm 20° C. kleinschlag. Nystagm. nach rechts Dreherregbarkeit normal
59	Eder Therese 32 J. (W.)	"	1. XII.	r 15 l 8	7 7	22 15	8 1	215 232	230 240	208 225			Schwerhörigkeit. Trommelfell bds. normal
60	Hoff Friedrich 21 J. (M.)	"	19. VI.	r 1 l 9	4 5	5 4	3 14	333 66	334 75	329 71			L.: Otitis externa, Verkalkung
61	Buhler Friedrich 19 J. (M.)	"	23. XI.	r 10 l 13	7 5	17 18	3 8	200 187	210 200	193 182			Sclerose bds.
62	Flößer Georg 31 J. (M.)	"	3. XII.	r 5 l 9	0 2	5 11	5 7	160 190	165 199	160 188			
63	Lichterfurner Franz 20 J. (M.)	"	3. XII.	r 5 l 0	2 7	7 7	3 7	200 222	205 225	198 218			

Zu Tabelle I.

1. Maximum der Gegenrollung für 45^0 rgn	25
lgn	23
2. Minimum der Gegenrollung für 45^0 rgn	0
lgn	—5
3. Maximum der Summe aus rgn und lgn	45
4. Minimum der Summe aus rgn und lgn	3
5. Durchschnittliche Summe aus rgn und lgn	17
6. Durchschnitt der Gegenrollung für 45^0 rgn	10
lgn	7,5
7. Maximum der Differenz zwischen rgn und lgn	21
8. Minimum der Differenz zwischen rgn und lgn.	0
9. Durchschnittliche Differenz zwischen rgn und lgn	5

Tabelle II

	Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Augen	rgn	ign	Summe	Differenz	kgr	45° rechtsq.	45° linksq.	Ohrbefund
1	Braun Johanna 45 J. (W.)	Schwindel	16. X.	r 1 l 30	25 30	22 22	47 52	3 8	200 175	225 205	178 153	Trommelfell bds. stark eingezogen. Keine Eiterung
2	Werner W. 22 J. (W.)	Schwindel	21. X.	r 1 l 27	19 27	13 20	32 47	6 7	201 175	220 202	188 155	R. Totaldefekt des Trommelfells, Secretion L.: Trommelfell epidermisirt
3	Ziegler Franz 47 J. (M.)	Starker Schwindel	4. VI. 5. VI. 5. VI. 30. VI.	r 1 l 12	10 12	11 6	21 18	1 6	365 378	375 390	354 372	Vor 5 Jahren Operation. Eiterung vor und nach der Operation, Fistelsymptom R.: deutliche Pulsation, Warzenfort- satz druckempfindlich L.: normal
4	Hofbauer Wolfgang 66 J. (M.)	Schwindel	25. VI.	r 1 l 15	16 15	15 15	31 30	1 0	170 190	186 205	155 175	R.: Einsenkung, Cholesteatommassen rechts Fistelöffnung, aus der Eiter hervorquillt. Operation vor 4 Jahr.
5	Winter Marie 31 J. (W.)	Schwindel Nystagmus nach der gesunden Seite	16. X.	r 1 l 10	16 0	4 4	20 4	12 4	220 178	236 178	216 174	R.: zentr. Perforation, Secretion L.: Einziehungen
6	Mayer Magdalena 24 J. (W.)	Schwindel	7. VI.	r 1 l 8	12 8	16 0	28 8	4 8	180 195	192 203	164 195	L.: Totaldefekt des Trommelfells, Secretion. Bds. Polypen. Radi- kaloperation, Fistelsymptom
7	Roth Johann 22 J. (M.)	Schwindel Nystagmus	21. VI. 23. VI.	r 1 l 10	10 10	11 9	21 19	1 1	196 194	206 204	185 185	

	Name, Alter Geschlecht	Beimerkung.	Datum	Augen	Ran	Iqn	Summe	Differenz	kgr	rechtsgen. 450	linksge. 450
8	Daxenberg Franz 35 J. (M.)	Schwindel	18. X.	r l	18 20	0 0	18 20	18 20	218 190	236 210	218 190
9	Schmidt Josefine 34 J. (W.)	Schwindel Nystagmus nach rechts	20. X.	r l	16 0	4 5	20 5	12 5	210 190	226 190	206 185
10	Hausmann Karoline 37 J. (W.)	Schwindel Nystagmus nach links	20. X.	r l	18 26	22 10	40 45	4 7	210 174	228 200	188 155
11	Neilinger Georg 44 J. (M.)	Schwindel	29. X.	r l	2 14	5 2	7 16	3 12	178 226	180 240	173 224

Ohrbefund

Kal. Prüfung: Bds. nach 300 ccm
270 Drehnystagmus sehr groß-
schlägig und intensiv. Nahnys-
tagmus rechts 5 Sek., links 10 Sek.
Nach 10 × Drehung

L.: Totaldefekt, Secretion, Kal. Prüf.
R.: 170 ccm 250 Wasser ruhen
ein deutl. Nystagm. nach links

L.: 60 ccm 250 verstärken d. Ny-
stagm. nach rechts 300 ccm be-
wirkt. Nystagm. nach links

Fistelsymptom bei Blick geradeaus;
bei Druck lebhafter Nystagm. nach
links; bei Aspiration gering. Ny-
stagm. nach rechts. Kal.: Verstär-
kung d. Nystagm. bds.

Fall auf d. Hinterkopf 1. II. 13. An-
geblich Verletzung d. Mittelohres
Kal. Prüf. R.: nach Verbrauch von
125 ccm 160 C Nystagm. nach links
L.: nach Verbrauch von 100 ccm
Nahnystagm. nach rechts
Bei 10 × Umdrehung nach links
grobschl. Nystagm. nach rechts v.
15 Sek., bei 10 × Umdrehung nach
rechts Nahnystagm. nach links
von 5 Sek. Dauer

Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Auge	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	45 ^o rechts	45 ^o links	Ohrbefund
12. Werl Franz 38 J. (M.)	Schwindel	2. X.	r 1	7 12	13 10	20 22	6 2	243 164	250 176	230 154	R.: starke Secretion, Perforation L.: Narbe, Verkalkung
13. Wagner Baltasar 60 J. (M.)	"	2. X.	1	10	12	22	2	215	225	202	Trommelfell bds. normal
14. Ruland Christ. 27 J. (M.)	"	3. X.	r 1	16 5	0 3	16 8	16 2	219 173	235 178	219 170	7. V. 13. Radikaloperation 20. VIII. Labyrinthoperation
15. Braun Josef 53 J. (M.)	"	3. X.	r 1	22 30	18 15	40 45	4 15	178 195	200 225	160 180	V. 13. Paracentese d. r. Ohres. Seit- her eitrigen Ausfluß 24. VII. Operation
16. Montigny Oskar 32 J. (M.)	"	8. X. 13. X.	r 1	6 7	14 14	20 21	8 7	209 206	215 213	195 192	Schwerhörigkeit, starker Schwindel- spont. kleinschlägiger Nystagmus nach links
17. Weber Friedrich 48 J. (M.)	"	4. X.	r 1	16 17	2 10	18 27	14 7	164 170	180 187	162 160	Bei Drehen nach links Nachnystagm. nach rechts 18. III. 13. Antrumoperation redits
18. Bäuml Marie 44 J. (W.)	"	6. X.	r 1	17 18	7 13	24 31	10 5	249 218	257 230	233 205	Otitis media acuta rechts. Kal. Prü- fung: bds. leichte Uebererregbark. bei Prüfung links Schwindelanfall
19. Neidiger Xaver 37 J. (M.)	"	14. X.	r 1	7 6	0 4	7 10	7 2	243 236	250 242	243 232	Otitis media bds.
20. Kuhner Georg 41 J. (M.)	"	14. X.	r 1	6 6	3 5	9 11	3 1	216 165	222 171	213 160	Radikaloperation

Name, Alter Geschlecht	Bemerkung	Datum	Ange	rgn	lgn	Summe	Differenz	kgr	rechtsgen. 450	linksgen. 450	Ohrbefund
21 Schwarz Anna 22 J. (W.)	Schwindel	24. X.	r 30 l 10	0 0	30 30	10 10	30 30	190 253	220 263	190 253	Otitis media chronica links. 3 mal operiert; letzte Operation vor 4 Jahren
22 Toetzier Johann 36 J. (M.)	Starker Schwindel	18. XI.	r 6 l 3	4 6	10 9	2 3	184 235	190 229	190 229	180 229	Sclerose bds. Typ. spontan. Drehschwindel
23 Lohr Hans 28 J. (M.)	Schwindel	11. XI.	r 3 l 4	2 10	5 14	1 6	182 200	185 204	180 190	180 190	
24 Jatsch Otto 35 J. (M.)	" (Trauma)	24. VI.	r 17 l 25	11 15	23 40	6 10	173 205	190 230	162 190	162 190	Trommelfell normal (im XII. 12 Kopft trauma; es blutete danach aus dem linken Ohr)
25 Wittmann Josef 38 J. (M.)	"	20. X.	r 17 l 13	0 12	17 25	17 1	210 200	227 213	210 188	210 188	Der P. wurde von einem Radfahrer überfahren. In der darauffolgend. Nacht leichte Blutung an dem linken Ohr. R.: Trommelfell ge- trübt, reflexlos
26 Koller Johann 57 J. (M.)	"	1. X.	r 17 l 12	12 29	5 5	210 210	227 198	198			Schwerhörigk., die d. P. auf einen Unfall zurückführt. L.: große Narbe
27 Kösler Josef 18 J. (M.)	"	23. X.	r 10 l 5	0 3	10 8	10 2	180 203	190 208	180 200	180 200	Vor einigen Wochen Schädelbruch. Trommelfell bds. normal unerreg- bar. Cal. bds.)
28 Eder Karl 37 J. (M.)	"	29. X.	r 22 l 12	4 10	26 22	18 2	183 253	205 265	179 243	179 243	L.: Atroph. Trommelfell Drehung n. rechts, Nachnystagm. n. links (feinschlägig), nach links Nachnys- tagm. nach rechts (grobschlägig)

	Name, Alter, Geschlecht	Bemerkung.	Datum	Auge					Summe		Differenz	kgr	45		linksgen.	Ohrbefund
				rgn	lgn					rechtsgen.			45			
29	Basché Josef 44 J. (M.)	Schwindel	6. XI.	r 13 l 17	10 23 12 29	3 5					180 193 224 241	170 212			Redits Narbe Otitis media chronica links	
30	Huber Alois 50 J. (M.)	Schwindel früher, jetzt ang. frei	7. X	r 16 l 6	12 28 5 11	4 1					232 248 235 241	220 230			Vor 10 Jahren Incision R.: Narbe, Trommelfell typisch ein- gezogen	
31	Haas Josef 48 J. (M.)	" jetzt frei	9. X.	r 24 l 20	20 44 25 45	4 5					216 240 195 215	196 170			R.: 26. II. 13. Operation	
32	Schmidt Karl 25 J. (M.)	" jetzt frei	9. X.	r 19 l 10	8 22 8 18	10 2					240 256 216 226	234 208			Otitis chronica media rechts. Starkes Fistelsymptom 3. X. 13. Radikaloperation	
33	Fröhlich Franz 11 J. (M.)	jetzt frei	9. X.	r 16 l 9	0 16 10 19	16 1					220 236 180 189	220 170			9. VI. 13. Operation	
34	Kleeberger Emanuel 53 J. (M.)	Schwindel	20. XI.	r 8 l 12	0 8 11 23	8 1					175 183 193 205	175 182				
35	Rechenmacher Math. 46 J. (M.)	jetzt frei	22. XI.	r 16 l 7	10 26 10 17	6 3					220 236 197 204	210 187			Sclerose rechts Otitis media links	
36	Hulle Franz 32 J. (M.)	Schwindel früher jetzt frei	28. XI.	r 7 l 9	8 15 10 19	1 1					228 235 165 174	220 155			Radikaloperation vor 14 Jahren	
37	Evert Aloisia 13 J. (W.)	Schwindel früher jetzt frei	1. XII.	r 14 l 7	6 20 -5 2	8 12					206 220 235 242	200 240			Links Radikaloperation im vorigen Jahre	

Zu Tabelle II.

1. Maximum der Gegenrollung für 45° rgn	35
lgn	25
2. Minimum der Gegenrollung für 45° rgn	0
lgn	-5
3. Maximum der Summe aus rgn und lgn	52
4. Minimum der Summe aus rgn und lgn	2
5. Durchschnittliche Summe aus rgn und lgn	22
6. Durchschnitt der Gegenrollung für 45° rgn	13
lgn	9
7. Maximum der Differenz zwischen rgn und lgn	30
8. Minimum der Differenz zwischen rgn und lgn.	0
9. Durchschnittliche Differenz zwischen rgn und lgn	5

Literatur.

1. R. Barany, Ueber die vom Ohrlabyrinth ausgelöste Gegenrollung der Augen bei Normalhörenden, Ohrenkranken und Taubstummen. Archiv für Ohrenheilkunde, 1905. Bd. 68.
 2. R. Barany, Apparat zur Messung der Rollbewegungen des Auges. Zeitschrift für Sinnesphysiol. Bd. 45.
 3. M. Bartels, Ueber Regulierung der Augenstellung durch den Ohrapparat. Archiv für Ophthalmol. 1910. Bd. 76.
 4. W. v. Bechterew, Ergebnisse der Durchschneidung des N. acusticus nebst Erörterung der Bedeutung der semicirkul. Kanäle für das Körpergleichgewicht. Pflügers Archiv. 1883. Bd. 30.
 5. Beck K., Experimentelle Untersuchungen über die Abhängigkeit der kompent. Augenbewegungen von Ohrapparaten. Verhandl. d. deutsch. otolog. Gesellsch. 1911. Frankfurt a. M.
 6. W. Nagel, Ueber die kompensat. Raddrehungen der Augen. Zeitschrift f. Psych. und Phisiol. der Sinnesorgane. Bd. 12.
 7. Feilchenfeld, Zur Lageschätzung der seitl. Kopfneigungen.
 8. Sachs und Meller, Ueber die optische Orientierung bei Neigung des Kopfes gegen die Schulter.
 9. v. Stein, Die Lehre von den Funktionen der einzelnen Teile des Ohrlabyrinths.
 10. Kohnstamm und Quensel, Ueber den Kern des hinteren Längsbündel. Neurolog. Zentralblatt 1908.
-

Lebenslauf.

Geboren bin ich, H. Abramowitsch zu Simferopol am 11. März 1890. Ich besuchte dort das Gymnasium, welches ich im Jahre 1909 mit Reifezeugnis verließ. Ich ging nach Deutschland, widmete mich der Medizin und studierte zehn Semester in München.
